

Détermination expo Genay du 14 octobre 2023

59 espèces présentées venant de l'Ain : Saint-Jean-de-Thurigneux et Ambronay

Famille	Genre	Espèce	Nom français	Caractères remarquables	Ecologie	Synonyme
Agaricaceae	Chlorophyllum	brunneum	Lépiote des jardins	Chapeau brun crème	Bois surtout conifères.	Macrolep <i>iota</i> brunnea
Agaricaceae	Macrolep <i>iota</i>	excoriata	Lépiote excoriée	Chapeau à squames s'excoriant vers la marge	Pelouses, lisières	Lep <i>iota</i> excoriata
Agaricaceae	Macrolep <i>iota</i>	procera	Lépiote élevée - Coulemelle	Chapeau mamelonné à squames fines. Anneau double. Stipe chiné	Forêts feuillus, lisières	
Amanitaceae	Amanita	betulae	Amanite des bouleaux	Chapeau, Lames brun crème. Stipe blanc brun à crème	Sous bouleaux	
Amanitaceae	Amanita	citrina	Amanite citrine	Odeur de pomme de terre crue	Forêts de feuillus	
Amanitaceae	Amanita	excelsa var. excelsa		Forme élancée. Chair immuable. Odeur agréable	Feuillus mêlés	
Amanitaceae	Amanita	muscaria	Amanite tue mouches	Chapeau rouge, squamules blanc concentriques	Bouleaux épicéas	
Amanitaceae	Amanita	pantherina	Amanite panthère	Chapeau brun flocons blancs. Volve en bourrelets hélicoïdaux	Feuillus mais aussi conifères	
Amanitaceae	Amanita	rubescens	Amanite rougissante, golmotte	Chapeau ocre brun floconneux. Chair rougissante. Volve nulle	Forêts	
Boletaceae	Boletus	edulis	Cèpe de Bordeaux	Chapeau à marginelle blanche	Forêts	
Boletaceae	Boletus	pinophilus	Cèpe des pins	Chapeau brun sombre. Tubes blancs puis verdâtres	Conifères, pins, bois mêlés	Boletus pinicola
Boletaceae	Caloboletus	calopus	Bolet à beau pied	Chapeau chamois pâle. Stipe rouge à la base.	Feuillus, conifères	Boletus calopus
Boletaceae	Leccinum	aurantiacum	Bolet orangé des chênes	Chapeau brun orangé. Stipe à méchules blanches puis brunes.	Sous différents feuillus	Leccinum quercinum
Boletaceae	Neoboletus	erythropus	Bolet à pied rouge	Chair jaune bleuisante. Pores rouges	Forêts	Boletus erythropus
Boletaceae	Suillellus	luridus	Bolet blafard	Ocre terne, pores rouges. Stipe réticulé rouge à fond jaune	Feuillus ou conifères calcicoles.	Boletus luridus

Chlorociboriaceae	Chlorociboria	aeruginascens	Chlorospenie vert-bleu	Disque vert turquoise. Stipe court mais présent	Bois décortiqué de feuillus	Chlorosplenium
Cortinariaceae	Cortinarius	delibutus	Cortinaire oint	Stipe violeté en haut, bracelet chiné en bas	Feuillus mêlés, surtout hêtres	
Cortinariaceae	Cortinarius	traganus	Cortinaire à odeur de poire	Grosse espèce. Chair brun ochracé. Stipe bulbeux.	Feuillus et conifères de montagne	
Crepidotaceae	Crepidotus	applanatus	Crépidote aplani	Marge striolée. Lames argilacées, ternes	Bois pourris de feuillus	Crepidotus caspari
Fistulinaceae	Fistulina	hepatica	Langue de bœuf	Forme de langue, revêtement gélatineux brun-rouge	Sur souches et troncs, surtout de chênes	
Fomitopsidaceae	Amaropostia	stiptica	Polypore astringent	Console blanc crème. Pores concolores pleurants.	Sur base des troncs morts ou vivants.	Postia stiptica
Fomitopsidaceae	Fomitopsis	pinicola	Amadouvier des pins	Sabot bossu brun roux à marge claire	Sur bois de conifères	Ungulina marginata
Fomitopsidaceae	Fomitopsis	betulina	Polypore du bouleau	Bourrelet épais en sabot	Sur bouleau vivant ou mort	Piptoporus betulinus
Ganodermataceae	Ganoderma	lucidum	Polypore luisant	Croûte vernissée grenat. Stipe latéral	Troncs de feuillus	
Hydnaceae	Hydnum	repandum	Pied de mouton	Chapeau à aiguillons beiges, bosselé. Stipe blanc. Chair âcre.	Forêts	
Hydnangiaceae	Laccaria	laccata	Laccaire laqué	Espèce rose carné concolore.	Feuillus, résineux, parcs, jardins	
Hymenogastraceae	Hebeloma	laterinum	Hébèlome "Belle Hélène"	Od.chocolat et fruitée. St.fusoïde à fibril. brunissant	Forêts de pins	Hebeloma edurum
Lycoperdaceae	Calvatia	gigantea	Vesse de loup géante	Jusqu'à 40 cm de diamètre. Blanc au début.	Jardins, parcs, prairies, haies	Langermannia gigantea
Mycenaceae	Mycena	rosea	Mycène rose	Ch.vieux rose. Stipe pâle. Lames concolores.Od.rave	Forêts de feuillus	
Mycenaceae	Mycena	flavo-alba	Mycène jaune pâle	Chapeau jaune pâle. Marge striolée	Pelouses moussues en forêt	
Omphalotaceae	Gymnopus	fusipes	Collybie à pied en fuseau	Chapeau brun rouge. St.torsadé fusiforme.	Base des troncs ou souches de feuillus	Collybia fusipes
Paxillaceae	Paxillus	involutus	Paxille enroulé	Marge veloutée cannelée. Lames moutarde séparables.	Forêts, pelouses, parcs	
Phallaceae	Clathrus	archeri	Anthurus d'Archer	En étoile. Rouge. Odeur cadavérique	Humus forestier	Anthurus Archeiri

Polyporaceae	Daedaleopsis	confragosa	Tramète rougissant	Chapeau dimidié. Marge aigue	Feuillus, au bord de l'eau	Trametes rubescens
Polyporaceae	Daedaleopsis	tricolor	Lenzite tricolore	Chapeau étagé zoné brun rouge foncé. Lanières ramifiées	Conifères. Cerisiers, noisetiers	Dae.confragosa v.tricolor
Polyporaceae	Picipes	badius	Polypore bai	Ch. brun coriace en entonnoir. Stipe noir	Feuillus divers	Polyporus durus
Polyporaceae	Polyporus	tuberaster	Polypore sur sclérote	Gros sclérote noir hypogé	Parasite et saprophyte sur feuillus	
Polyporaceae	Trametes	versicolor	Tramete versicolore	Chapeau imbriqués minces, multicolores, zonés, coriaces	Sur tout bois morts mais surtout feuillus	Coriolus versicolor
Russulaceae	Lactarius	decipiens	Lactaire trompeur	Ch.beige rosé. Lait jaunissant. Odeur géranium	Charmes, chênes	
Russulaceae	Lactarius	quietus	Lactaire tranquille	Chapeau micacé cerné. Odeur de lessive. Lait épais blanc doux	Chênes	
Russulaceae	Russula	albonigra	Russule blanche et noire	Chair noircissante. Saveur mentholée	Forêts	
Russulaceae	Russula	amoenolens	Russule odeur d'amoéna	Saveur très âcre. Chapeau marron	Feuillus, pinèdes	
Russulaceae	Russula	chloroides	Russule verdâtre	Chapeau centre déprimé. Haut du stipe vert pâle. Odeur hareng	Feuillus, hêtres	
Russulaceae	Russula	cyanoxantha	Russule charbonnière	Chapeau ridulé. Lames lardacées. Stipe blanc	Forêts de feuillus	
Russulaceae	Russula	delica		Chapeau blanc ochracé, centre creux étroit.	Feuillus	
Russulaceae	Russula	mairei	Russule du hêtre	Chapeau rouge assez vif. Saveur brûlante	Sous hêtres	Russula fageticola
Russulaceae	Russula	nigricans	Russule noircissante	Lames très espacées, chair rougit puis noircit. Saveur douce	Feuillus et conifères	
Russulaceae	Russula	olivacea	Russule olivacée	Chapeau mat ridulé concentriquement. Lames jaunes, arête rouge	Plutôt feuillus(hêtres)	
Russulaceae	Russula	parazurea	Russule bleutée	Ch.gris bleuté. Lames blanc crème un peu piquante	Sous feuillus	
Russulaceae	Russula	subfoetens	Russule presque fétide	Chapeau .ocre fauve, visqueux au bord. Réaction potasse jaune	Feuillus clairs	

Russulaceae	Russula	versicolor	Russule versicolore	Ch.polychrome. Stipe jaunissant. L.crémes. Acre	Sous bouleaux	
Russulaceae	Russula	violeipes fo. citrina	Russule à pied violet fo.citrine	Chapeau jaune citrin vif. St.blanc ou presque	Forêts	
Russulaceae	Russula	krombholzii	Russule pourpre et noire	Chapeau pourpre. Stipe gris taché de rouille. Acreté faible	Allées herbeuses ou boueuses des feuillus	Russula atropurpurea
Sclerodermaeae	Scleroderma	citrinum	Scléroderme commun	Chapeau à grosses verrues	Forêts	
Stereaceae	Stereum	hirsutum	Sterée hirsute	Fructification imbriquée, ondulée, veloutée ocre roux	Bois coupé de feuillus	
Strophariaceae	Hypholoma	fasciculare	Hypholome en touffes	Chair très amère	Sur souches	
Tricholomataceae	Melanoleuca	grammopodia	Tricholome à pied rayé	Déprimé avec mamelon. Stipe strié. Odeur forte	Prés, taillis, potagers	
Tricholomataceae	Tricholoma	columbetta	Tricholome colombette	Chapeau blanc soyeux. Taches bleues, bas du pied.	Forêts de feuillus	

André, Christiane, Jacqueline, Patrice, Pierre Cabrol, Claudine et Michel.